

നേർവള്ളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുമാ

- ▶ രാസവളങ്ങൾ കഴിയുന്നതര തരങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുക.
- ▶ വളപ്രയോഗത്തിന് മുമ്പ് നവലിലയെ വെള്ളം വാർത്തു കളയുക. പിന്നീട് മരണശേഷിയിൽ മൃഗങ്ങളുമായി മൃഗങ്ങളും മരണശേഷി കളയാൻ പറ്റും.

കുടുംബം നിയന്ത്രണം

കുടുംബം നിയന്ത്രണം

- ▶ ഇരു പച്ചനിറത്തിലുള്ള ശരീരവും റോബി നിറത്തിലുള്ള ശിരസ്സുമുള്ള പുഴു ബീഡ് പോലെയുള്ള കുട്ടിനുള്ളിൽ കണ്ടുവരും.
- ▶ നെല്ലിലെ കീടം മാറ്റി കൃഷിയിടങ്ങളിലെ റോബി അധിമിറ്റി പൂച്ചകൾ ഇലകൾ തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷിയിടങ്ങളിലെ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിപ്പിക്കുന്നതും കാണാം.
- ▶ നവലിലയെ വെള്ളം മൂക്കു മിന്നലാക്കി വീശുക
- ▶ 50 കി.ഗ്രാം തണുത്തൊഴുതിയിട്ടുള്ള 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ പാട്രൻ വിനോ (1 ഫുക്കോനി) ആകമാനം മുക്കിത്തന്നെ കിട കർമ്മത്തിന് തളിയ്ക്കുക.



കൊടുമി വെള്ളം

- ▶ മരണശേഷിയിലുള്ള നെല്ല് കീടങ്ങളിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടിയോളം വെള്ളത്തിൽ ശോഭിച്ച് കുതിച്ചിട്ടുള്ള സ്പോർകളുടെ കൂട്ടം മാറ്റുന്നു.
- ▶ ആകമാനം കണ്ടുവരുന്ന സമ്പലങ്ങളിൽ മാത്രം 2% കീടനശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തളിയ്ക്കുക.



രക്ഷ

പുഴു കീടനശിപ്പിക്കൽ

- ▶ **പുഴു കീടനശിപ്പിക്കൽ**
ഇരുമ്പിന്റെ ഇലകൾ പൂച്ചപ്പാമ്പുകളും ഉപയോഗിച്ചു പുഴു കീടനശിപ്പിക്കുന്നതിന് താമസം കുറയ്ക്കുന്നു.
- ▶ **പുഴു കീടനശിപ്പിക്കൽ**
നൈസിക തടവിലായിട്ടുള്ള മരണശേഷിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മരണശേഷി വരെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞു തുടർച്ചയായി.
- ▶ **കൊടുമി വെള്ളം**
നൈസിക തടവിലായിട്ടുള്ള മരണശേഷിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മരണശേഷി വരെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞു തുടർച്ചയായി.
- ▶ **കൊടുമി വെള്ളം**
നൈസിക തടവിലായിട്ടുള്ള മരണശേഷിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മരണശേഷി വരെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞു തുടർച്ചയായി.

- ▶ **കൊടുമി വെള്ളം**
നൈസിക തടവിലായിട്ടുള്ള മരണശേഷിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മരണശേഷി വരെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞു തുടർച്ചയായി.
- ▶ **കൊടുമി വെള്ളം**
നൈസിക തടവിലായിട്ടുള്ള മരണശേഷിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മരണശേഷി വരെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞു തുടർച്ചയായി.

പുഴു കീടനശിപ്പിക്കൽ

വെള്ളം

- ▶ **വെള്ളം**
നൈസിക തടവിലായിട്ടുള്ള മരണശേഷിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മരണശേഷി വരെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞു തുടർച്ചയായി.

വെള്ളം

- ▶ **വെള്ളം**
നൈസിക തടവിലായിട്ടുള്ള മരണശേഷിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മരണശേഷി വരെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞു തുടർച്ചയായി.

കൃഷി - കീടനശിപ്പിക്കൽ

വെള്ളം

- ▶ **വെള്ളം**
നൈസിക തടവിലായിട്ടുള്ള മരണശേഷിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മരണശേഷി വരെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞു തുടർച്ചയായി.

വായ

- ▶ നായകൻ. വെള്ളം കഴിഞ്ഞു തുടർച്ചയായി.

- ▶ കുലം വെള്ളം തുറന്നു എടുക്കുന്നു
- ▶ കുലം വെള്ളം തുറന്നു എടുക്കുന്നു

സംഖ്യ	മൂല്യം (ശതമാനം)	മൂല്യം (ശതമാനം)	മൂല്യം (ശതമാനം)
നട്ട്	85	325	100
ബെർ	65	250	100
മുൻ	65	100	
നാലി	65	100	
അഞ്ചി	65	100	
കുലം	65		
ആകം	410	575	500

- ▶ **വെള്ളം**
നൈസിക തടവിലായിട്ടുള്ള മരണശേഷിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മരണശേഷി വരെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞു തുടർച്ചയായി.

കീടനശിപ്പിക്കൽ

വെള്ളം

- ▶ **വെള്ളം**
നൈസിക തടവിലായിട്ടുള്ള മരണശേഷിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മരണശേഷി വരെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞു തുടർച്ചയായി.



വെള്ളം

- ▶ **വെള്ളം**
നൈസിക തടവിലായിട്ടുള്ള മരണശേഷിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മരണശേഷി വരെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞു തുടർച്ചയായി.



വെള്ളം കഴിഞ്ഞു തുടർച്ചയായി

പുഴു കീടനശിപ്പിക്കൽ

- ▶ **പുഴു കീടനശിപ്പിക്കൽ**
നൈസിക തടവിലായിട്ടുള്ള മരണശേഷിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മരണശേഷി വരെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞു തുടർച്ചയായി.

വെള്ളം

- ▶ **വെള്ളം**
നൈസിക തടവിലായിട്ടുള്ള മരണശേഷിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മരണശേഷി വരെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞു തുടർച്ചയായി.

വെള്ളം

- ▶ **വെള്ളം**
നൈസിക തടവിലായിട്ടുള്ള മരണശേഷിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മരണശേഷി വരെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞു തുടർച്ചയായി.



വെള്ളം

- ▶ **വെള്ളം**
നൈസിക തടവിലായിട്ടുള്ള മരണശേഷിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മരണശേഷി വരെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞു തുടർച്ചയായി.

വെള്ളം

- ▶ **വെള്ളം**
നൈസിക തടവിലായിട്ടുള്ള മരണശേഷിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മരണശേഷി വരെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞു തുടർച്ചയായി.

മായി കാണുന്നു.

- ▶ പച്ചചേണകത്തിന്റെ തെളിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ (20 ഗ്രാം 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) 4 ഗ്രാം ഡൈന്തോൻ 145 ഭാഗത്തു ഉണ്ടായുള്ള ഉരുട്ടലാണു നന്നായുന്ന വീതിയിൽ തളിയിടുക.



മുളക് - ഇലച്ചുരുൾ രോഗം

- ▶ തളിയിലകൾ ചുറ്റും ചെടി തുടര വളർച്ച മുറുകുകയുണ്ടാകുന്നു.
- ▶ രോഗം പരത്തുന്ന കടങ്ങുള്ള അകറ്റാൻ ഓസംകോമ്പോയ്റ്റ് 30 EC, 15 മില്ലി/ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി തളിയിടുക.



തക്കാളി - വെള്ളിച്ചി

- ▶ ഇലയുടെ നീറ്റാൻ കൂടിക്കയ്യാൻ കരമാണു ഇല ചത്തുകളിച്ചു ഉണക്കിപ്പുകയ്യാകുന്നു.
- ▶ മഞ്ഞബോർഡിൽ ആവമൊക്കെയു തോട്ട് പലയിടത്തായി തൂക്കിയിടുക.
- ▶ 2% നിത്യതുള്ള ഹൈസ്റ്റേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ മിശ്രിതമാക്കി 5% നിത്യതുള്ള മെയ്റ്റിൽ കയ്യാമുരടിപ്പണ നൽകിക്കൊടുക്കുക.



കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ

- ▶ ഇലകളിൽ സ്പോഡോപറ്ററ്റാ ഇലതീനിപ്പുഴുക്കളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത്മര കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചു നശിപ്പിക്കുക.
- ▶ ആകമാനം തുടരുമാറകയാണെങ്കിൽ ഫെന്തിം (2 മി.ലി/10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) തളിച്ചു കൊടുക്കുക. വിളവെടുപ്പ് അടുത്ത ശമയത്താണ് ആകമാനമെങ്കിൽ ഓസംക്വേറോണൻ (സ്യൂഡൻ, ധ്യാ) എന്ന കടനാശിനി പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

കൂറ്റമുളക് - പൊള്ളുവണ്ടി

- ▶ തളിയിലകളിലും ഇളം തണ്ടുകളിലും പുഴുക്കൾ തുളിച്ചു മുടിക്കാശം തീയുന്നതിന്റെ സഹായം നന്നാക്കി ഉണക്കി നശിപ്പിക്കുക. മണിമീശി പൊളുതലായി ഉണക്കി കയ്യാമുരടിപ്പണ തോട്ട് ചെയ്യുകയും.
- ▶ മെയ്റ്റിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കടനാശിനി 0.02% നിത്യതുള്ളത് (50 മി.ലി ഒരു ലിറ്റർ



വെള്ളത്തിൽ) കലക്കി തിരിയിട്ടുമേയ്ക്കു തിരികളിൽ മണി പിടിയിരുത്തുക തളിയിടുക എന്നാണ്.

- ▶ പൊളുതലിന്റെ ആകമാനം കൂടുതലായാണെങ്കിൽ കീനോബിലോൻ (എക്സോക്സർ 2 മി.ലി) / ഓസംകോമ്പോയ്റ്റ് (ഗ്രാമർ 15 മി. ലി) ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തിരിയിട്ടുമേയ്ക്കു തിരികളിൽ മണി പിടിയിരുത്തുകയും ആവശ്യമെന്നു കണ്ടാൽ മണി കൾ മുഖപ്പെടുത്തലും തളിയിടുക.

സുന്ദറാ

- ▶ രോഗശാല തുലാ ഇലകൾ പൊഴിയിക്കുകയും ശാലകൾ ഉണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. തിരികളിൽ അവിടെവിടെ കറുത്ത പാടുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തിരികായിരുന്നു.
- ▶ വേളിൽ പിണ്ണാക്ക് ചെടി ഒന്നിന് 500 ഗ്രാം വീതം നൽകുക.
- ▶ ഒരു ശതമാനം നിത്യതുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം മെയ്റ്റിൽ ചേർത്ത് മരസങ്ങളിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കുക.
- ▶ 0.2% കോപ്പർ മെക്സിലക്യോറൈവ് 5 ലിറ്റർ വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക.



മാവ് - കാമ്പിച്ചി

- ▶ കാമ്പിച്ചി ആകപ്പെട്ട പഴങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു നശിപ്പിക്കുക.
- ▶ പഴയ 1 പഴത്തെ (പാളയൻകോടൻ പഴം, ശർക്കര, 2 മി.ലി മാലത്തിയോൺ) റെറക്ടറിന് 10 എണ്ണം എന്ന തോതിൽ തൂക്കിയിടുക.
- ▶ മിംഗെൽ യുജിനോൾ മകണകൾ റെറക്ടറിന് 10 എണ്ണം എന്ന തോതിൽ സഹായിക്കുക.



കൊമ്പുണ്ടക്കം

- ▶ കൊമ്പുണ്ടക്കം തടയുന്നതിന് കേടുപാറാക്കുന്ന റെറ്റാ റെട്ടി മാറ്റി 1% ബോർഡോ മിശ്രിതം തളിച്ചു കൊടുക്കുക.



കൃഷിമേഖല വ്യക്തിഗത കേന്ദ്രങ്ങൾ, കൃഷിക്കുടിപ്പട്ടണങ്ങൾ, ഓസംക്വേറോണൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓസംക്വേറോണൻ സ്യൂഡൻ എന്നിവയെ ഉപയോഗിച്ച് കടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നു.

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് :
ATMA മലപ്പുറം
E-mail: atmamalappuram@gmail.com

കേരള കാർഷിക വികസന കർഷക ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് - ആയ മലപ്പുറം

ഫിരിതസന്ദേശം

പ്രതിമാസ കൃഷി നിർദ്ദേശ പത്രിക

സമ്പന്നങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾ, കടമയോ നിന്നേതുമായ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ കൃഷി രംഗവിലൂടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം നടത്തേണ്ടതാണ്.



നെല്ല്

മുണ്ടകൻ

- ▶ 80-85% നെൽമണികൾ വെവ്കോൽ നിലമാകുമ്പോൾ കൊടുത്ത് തുടങ്ങാം. ഏഴുപാളെ ഒന്നുമോല മുഷ്യന്മാരുമായി കൊടുപ്പുന്നതിന് ഏഴുപാളെ മുഴുവൻ വർത്തനം ചെയ്യണം.
- ▶ വിത്തുടുക്കുന്ന പാടങ്ങളിൽ കളപ്പുറങ്ങൾക്കിടയിൽ നീക്കം ചെയ്യണം. കാട്ടെപ്പുറമേക്കായിട്ടായിട്ട് നടുവിലെ സുപാടങ്ങളിൽ മാത്രം വെള്ളിച്ച അലക്കിക്കയ്യാണു പറ്റുമെന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക.

പച്ചെ

- ▶ പച്ചെ നടുങ്ങ സമയത്തിന്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗം അറ്റിയിൽ തട്ടു നാക്കണം.

നിലമാറ്റങ്ങൾ

- ▶ കേൾ നിലങ്ങളിൽ അറ്റാപം കുറയ്ക്കുന്നതിന് കുമാരോ/ലോളരോമെറ്റ് 240 കി.ഗ്രാം/എക്കറിന് പാടത്ത് വിതര്യം.
- ▶ അടിമുളയായി ഏക്കറിന് കാലിമ്പളം (2 ടൺ)/മണ്ണിറ കലമ്പലൂ (1 ടൺ) ചേർക്കുക.
- ▶ സൂക്ഷ്മമൂലകങ്ങൾ മണ്ണ് ഹരിശേഷിതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചേർക്കുക.

മണിഷ്യം	മണിഷ്യം സൾഫേറ്റ്	50 കി.ഗ്രാം
ബോറോൺ	ബോറാക്സ്	50 കി.ഗ്രാം
സിലി	സിലി സൾഫേറ്റ്	8 കി.ഗ്രാം
സിങ്ക്	സിങ്ക്	300-400 കി.ഗ്രാം

- ▶ സമ്പൂർണ്ണ (ബാറ്റിലിംഗോള സൂക്ഷ്മമൂലക മിശ്രിതം) നട്ട് 20-30 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം 10 ഗ്രാം / 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി തളിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മമൂലകങ്ങളുടെ അപാദംഭിത പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.

വിത്ത് - ലോറ്റി. കാബേജ, മട്ടുതിലേണി, ഹർഷ. അനാപുർണ്ണ, ഗൗരി, ഉമ പ്രാവ.

- ▶ പരിച്ചുരുട്ടുന്നതിന്: 32 കി.ഗ്രാം/എക്കറിന്

വിത്ത് പരിചരണം

- ▶ വിത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സൂര്യലോകമാണേറ്റ്/ടെക്ടോയമി 20 ഗ്രാം/1 കി.ഗ്രാം വിത്ത് എന്ന തോതിൽ കുളപ്പൈർത്തി 12 - 24 മണിക്കൂർ വച്ചു തീയ്ക്ക ശേഷം വിതയിടുക.
- ▶ പരിച്ചുരുട്ടുന്നതിന് 2 ദിവസം മുന്ത് സൂര്യലോകമാണേറ്റ് 20 ഗ്രാം/1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കൂട്ടിച്ചുട്ടു സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതും, പരിച്ചുരുട്ടുന്നതിന് മുൻപ് സൂര്യലോകമാണേറ്റ് ഭാഗമായി (20 ഗ്രാം/1 ലിറ്റർ വെള്ളം) തുടിച്ചു തുടിച്ച ശേഷം നടുമ്പുറം നല്ലതാണ്.

അറ്റ് നടുവ്

- ▶ 15 x 10 cm അകലത്തിൽ ഒരു ചുവട്ടിൽ 2 - 3 അറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന വിധം തടുക്കുക.
- ▶ ഗ്രസകാരെ മുറുക്കിയുളള ഇനം 10 - 20 ദിവസത്തിലോ പരിച്ചുരുട്ടേണ്ടതാണ്.

ഒരോ 3 മീറ്റർ കഴിയുന്നതോടൊത്ത് 30 cm സന്ദേശം വിടുന്നതിന് വളയേലാക്കുന്നതും മരുമ്പിക്കുന്നതിനും കടിയേറിയ കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായകമാകുന്നു.

അടിമുളയോടൊത്ത് (1 ഏക്കറിന്) കൊടുപ്പേണ്ട ഇലവകാശികളെ			
ഇനം	പൊളുതലാക്കേണ്ടത് (കി.ഗ്രാം)	മേറ്റ് ചേർക്കാവേണ്ടത് (കി.ഗ്രാം)	
ഗ്രസകാരെ മുറുക്കിയതിനും	70	50	
മധ്യകാല മുറുക്കിയതിനും	90	15	